MEDSTOM Dental Clinic

гр. София, и бул.Княз Ал.Дондуков 26А, www.medstom.com

УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД

1. Непосредствено след операцията:

- След 2-3 часа от операцията , ефектът от местната упойка се изчерпва и тогава може да се появяви лека , преминаваща болка в областта на манипулацията. Препоръчваме Ви Analgin или Aulin, но в никакъв случай Aspirin или Acetysal;
- Хранене – след 2 часа. Течности можете да приемате веднага , без гореши ,газирани напитки.Без горещи храни , без твърди и жилави храни – предимно мека и течно – кашава храна;
- Ако сте пушач не пушете първите 24 часа;
- Спазвайте добра устна хигиена , използване на вода за уста и аплициране на предписаните Ви медикаменти локално ;Не жабурайте агресивно ,а леко ,с глава наведена на противоположната страна .
- Нормално е да има леко , минимално, кървене от раната.Не плюйте , а преглъщайте!
- Не масажирайте и не травмирайте мястото на операцията.
- Наличните зъби около имплантите се почистват с мека четка в посока от долу на горе за долна челюст и от горе на долу за горна челюст, без вртеливи движения;
- Не упражнявайте натиск върху имплантите.
- Имплантатите не се почистват с механична или електрическа четка;
- Ако денталния лекар ви е предписал медикаменти , спазвайте дадените ви предписания.

2. Дългосрочно след операцията:

- След 24 часа от операцията е възможно да се получи лек оток на меките тъкани. Затова в първите 1-2 часа след операцията , слагайте студени компреди екстраорално! (отвън).
- Спазване на посочените от лекуващият имплантолог контролни прегледи – на първата седмица, на първият месец, на третият месец, на шестият месец;
- Редовно използване на предадената шина за бруксизъм (средно 6-8 часа в денонощието);
- Контролно посещение при лекуващият Ви зъболекар за профилактика на устната кухина (почистване на зъбен камък и плака) и контролна рентгенография (при необходимост).

Гаранцията е валидна при стриктно спазване на горе-посочените указания!

Тя не важи в случаите, когато:

- Инструкциите на зъболекаря не се спазват;
- Устната хигиена е пренебрегната от страна на пациента;
- Пушене, злоупотреба с наркотици или лекарства;
- Значителна загуба или увеличаване на теглото в рамките на кратък период от време;
- Тъканта на венците се свива или костта естествено намалява;
- Появата на нови общи заболявания, което има неблагоприятно въздействие върху дъвкателния орган (например епилепсия, остеопороза, прекомерно излагане на рентгенови лъчи или химиотерапия);
- Повреди, причинени от екстремни натоварвания (бруксизъм , травми);
- Щети, причинени от злополуки, спорт или трета страна, когато друг зъболекар провежда лечение без наше знание и одобрение;
- Неподходящ избор на цвят и форма на зъбните корони/мостове от пациента. По време на процеса на създаване им, пациентът има възможност да избере предпочитан цвят. Денталният лекар не носи отговорност за решението му, ако по-късно прецени, че не харесва цвета или формата, които е избрал.Имайте предвид , че цветът на конструкцията е възможно да се промени от храни и напитки .